

## Procedimento Operativo

### CONSENTIMENTO INFORMADO PARA BIOPSIA PROSTÁTICA

### CONSENTIMENTO INFORMADO PARA BIOPSIA PROSTÁTICA

**Este documento deve ser lido antes da marcação do exame. Se tiver dúvidas, não hesite em perguntar, serão esclarecidas atempadamente.**

A biópsia prostática transrectal ecodirigida é um exame que corresponde, após a aplicação de anestesia local, à introdução no ânus de uma sonda de ecografia e à realização de várias picadas na próstata com extracção de pequenos fragmentos. Os fragmentos colhidos são enviados para o Laboratório de Anatomia Patológica para realização de exame histológico.

Caso esteja a tomar algum medicamento que interfira com a coagulação sanguínea, como por exemplo antiagregantes plaquetários (ácido acetilsalicílico; acetilsalicilato de lisina; dipiridamol; indobufeno; ticlopidina; triflusal, etc) deve suspender a medicação 5 dias antes do exame. Contacte o seu médico assistente e confirme que não tem qualquer problema em suspender a medicação.

Se estiver hipocoagulado, com por exemplo varfine, acenocumarol (Sintron®) ou rivaroxabeno (xarelto®), deve contactar o seu médico assistente ou centro de hipocoagulação no sentido de reverter a hipocoagulação e assim permitir que o exame seja realizado.

#### **PREPARAÇÃO PARA O EXAME**

**Nos dois dias anteriores:** Ciprofloxacina 500 mg (antibiótico), um comprimido de manhã e outro à noite.

**No dia do exame:** Ao levantar, clister de limpeza (pex. Microlax ® ou ClyssGo ®). Tomar ciprofloxacina 500mg ao pequeno-almoço.

Se o exame se realizar de tarde, dieta ligeira ao almoço.

**Nunca vir para o exame em jejum.**

Traga as últimas análises com os valores de PSA e a última ecografia prostática, bem como a requisição do exame passada pelo seu médico.

**Depois do exame:** Continuar a ciprofloxacina 500mg de acordo com as instruções dadas pelo médico.

Deve beber líquidos (água ou chá) em quantidades adequadas nas primeiras 24-36 horas e evitar estar muito tempo ao calor e/ou sol nos dias subsequentes.

Deve repousar no dia da biópsia ou evitar esforços.

**CONSENTIMENTO INFORMADO PARA  
BIOPSIA PROSTÁTICA**

**Complicações mais frequentes:**

É comum após o exame e durante 2 a 7 dias apresentar perdas de sangue na urina (hematúria) ou nas fezes (rectorragias). Essas perdas não representam qualquer risco. É também comum aparecer sangue no sêmen (hematospermia), o qual pode durar 2 a 3 meses, dependendo do ritmo de ejaculações. Isso é o resultado natural da absorção e eliminação do hematoma resultante da biópsia e também não representa sinal de perigo.

Igualmente deverá recorrer a um serviço de Saúde, no caso de uma hemorragia que considere exagerada (geralmente se há coágulo), quer por via urinária quer nas fezes.

**Se desenvolver febre alta (superior a 38°C) ou inferior, mas persistente, deverá entrar em contacto connosco ou ir à urgência hospitalar mais próxima imediatamente.**

**Contacto do Hospital Soerad :** 261 339 650  
[www.soerad.com](http://www.soerad.com)

Declaro ter lido e compreendido as informações supra referentes à biópsia prostática eco guiada com sonda rectal.

Declaro que me foi entregue uma cópia integral deste documento.

Assinatura do próprio:

---

Assinatura de representante legal com BI ou outro documento de identificação:

---